

薬価基準追補収載（新薬）のお知らせ

平成21年1月16日
福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は新薬の薬価基準追補収載を平成21年1月16日に告示，即日実施した。

〔内 用 薬〕

劇：劇薬，指：指定医薬品，処：処方せん医薬品

分類	医薬品名（会社名）	規格・単位	薬価（円）	規制	備考（成分，薬効）
625	インテレンス錠 100mg （ヤンセン ファーマ）	100mg，1 T	619.80	劇 指 処	エトラビルン 抗HIV薬。 非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬。 適応はHIV-1感染症。 成人には，1回 200mg を1日2回食後投与。空腹時投与はAUCが減少する。 他の抗HIV薬に耐性が認められる場合等に投与する。 必ず他の抗HIV薬と併用するが，因果関係が特定できない重篤な副作用発現時や治療継続が困難な場合は，原則として本剤および他の抗HIV薬の全てを一旦中止する。 ヌクレオシド系・非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬を含む併用療法で効果不十分となった患者には，本剤とヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬のみの併用はしない。 非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬との併用の有用性は未確立なので，併用を避けることが望ましい。 抗HIV薬の治療経験がない患者への有効性・安全性は未確立。 HIV逆転写酵素と直接結合し，DNAポリメラーゼの触媒部位を失活させ，RNA依存性およびDNA依存性のDNAポリメラーゼ作用を阻害する。 略号：ETV
625	シーエルセントリ錠 150mg （ファイザー）	150mg，1 T	2,278.80	劇 指 処	マラビロク 抗HIV薬（HIV侵入阻害薬）。 CCR5（CCケモカイン受容体5）阻害薬。 適応はCCR5指向性HIV-1感染症。 成人には，1回 300mg を1日2回投与。食事の有無にかかわらず投与が可能。 必ず他の抗HIV薬を併用し，併用薬に応じて適宜増減する（CYP3A阻害薬との併用の場合は，1回 150mg に減量）。 他の抗HIV薬では効果不十分な場合または忍容性がない場合に限り投与する。 指向性検査を実施し，CXCR4指向性およびCCR5/CXCR4二重または混合指向性には投与しない。 抗HIV薬の治療経験がない患者への有効性・安全性は未確立。 新規の作用機序を有する抗HIV薬。HIVが宿主細胞に侵入する際に利用する補受容体CCR5に選択的に結合し，HIV-1エンベロープ糖タンパク質 gp120とCCR5との相互作用を遮断して，宿主細胞への接着および侵入を阻害する（CXCR4指向性またはCCR5/CXCR4二重指向性ウイルスには無効）。また，他の抗HIV薬とは標的分子が異なるため，他の抗HIV薬に耐性のウイルスにも有効性が示唆されている。 略号：MVC