

薬価基準追補収載（報告品目等）のお知らせ

平成21年9月3日

福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は抗HIV薬の薬価基準追補収載を平成21年9月3日に告示，即日実施した。

〔内用薬〕

劇：劇薬，処：処方せん医薬品

分類	医薬品名（会社名）	規格・単位	薬価（円）	規制	備考（成分，薬効）
625	プリジスタナイーブ錠400mg (ヤンセンファーマ)	400mg, 1 T (ダルナビル として)	921.90	劇 処	ダルナビル エタノール付加物 HIVプロテアーゼ阻害薬。 適応はHIV感染症。 成人には，1回 800mg とリトナビル1回 100mg をそれぞれ1日1回食事中または食直後に併用投与。リトナビル（ノービアTM）は薬物動態学的増強因子（ブースター）として必ず併用。 治療経験がないHIV感染患者に使用する。抗HIV薬の治療経験がある患者への用法・用量については，プリジスタTM錠 300mg の添付文書を参照する。 無症候性HIV感染症の治療開始時期は，患者のCD4陽性リンパ球数および血漿中HIV RNA量を確認するとともに最新のガイドラインを確認する。 小児HIV感染症に対する有効性・安全性は未確立。 HIVは感染初期から多種多様な変異株を生じ，薬剤耐性が発現しやすいので，本剤は他の抗HIV薬との併用が必要。ジダノシン（ヴァイデックスTM）を併用する場合は，ジダノシンは食間投与なので，本剤およびリトナビル投与の1時間前または2時間後に投与。 HIV-1プロテアーゼに高い親和性を有し，選択的に阻害して，感染性を有する成熟ウイルスの形成を抑制する。多剤耐性ウイルスに効果が高い。 既発売のプリジスタTM錠 300mg は，他の抗HIV薬で十分な効果が期待できない場合や忍容性に問題がある場合に限り使用（1回 600mg，リトナビル1回 100mg をそれぞれ1日2回食事中または食直後に併用投与）。 略号：DRV