

薬事情報センターに寄せられた県民・医療従事者からの相談事例
(2013年8月)

【適正使用】

Q：ユニシアTM配合錠とプロプレスTMを服用中。知人からバイアグラTMをもらったが、説明書に狭心症の治療薬等と一緒に使用してはいけないと書いてある。血圧の薬と一緒に使って良いか？
(県民)

A：降圧剤との併用で降圧作用が増強する報告があるので注意が必要。また、病態により使用に注意が必要な場合もある。バイアグラTMは医師の診断のもとに使われる薬であり、自己判断で使用する事は勧められない。また、他人からもらった薬は使用しない。

Q：脳梗塞後にエパデールTMS900を服用中。食直後に服用の指示があるが、朝食を抜く時がある。食わずに飲んでも良いか？(県民)

A：胃が空の状態では吸収が悪くなり、効果が低下する可能性があるため、食事の直後に飲む。バナナやクッキーなど、何か軽く食べて服用すると良い。

Q：中学生が補中益気湯と五苓散を服用しているが、飲みにくいので、毎回少量の水で溶かし、ペースト状にしてプリンに混ぜている。ペースト状にしたものを1回分ずつラップに包んで冷凍して良いか？(県民)

A：品質保持の保証ができない。服用前に開封すること。

Q：サインバルタTMを服用中。以前受診した病院で処方され残っているリリカTMとリボトリールTMを飲んでいるが、3種類飲んだら悪いのか？現在の主治医には言っていない。(県民)

A：以前の薬が今の症状に必要な薬かは不明。自己判断で残っている薬を使用しない。現在処方されている薬だけを指示通り飲む。

Q：中学1年生(12歳)の娘の生理痛に、薬局で買ったロキソニンTMSを飲ませて良いか？説明書を捨ててしまった。(県民)

A：15歳未満は使用しない。

【相互作用防止】

Q：トミロンTM、ソランタールTM、トラネキサム酸、ラフチジン、補中益気湯を服用中。一般用医薬品の大正漢方胃腸薬の「爽和」を買って飲んで良いか？(県民)

A：「爽和」には、甘草が含まれている。甘草は補中益気湯にも含まれ、併用により副作用が発現する可能性がある(むくみ、体重増加等)。

Q：夕食後にグラダキシムTMを毎日飲んでいるが、ビールを飲んで良いか？(県民)

A：アルコールとの併用で、中枢神経抑制作用が上昇するので注意が必要。飲まない方が良い。