

薬事情報センターに寄せられた県民・医療従事者からの相談事例
(2014年2月)

【適正使用】

Q：腰の痛みでトリプタノール™が処方されたが、薬の説明書には「気持ちを楽にして意欲を高める薬」と書いてある。飲んで良いか？（県民）

A：うつ病等に使用される薬だが、神経性の痛みなどに補助的に使用される。指示通りに服用する。

Q：インフルエンザでリレンザ™、ジスロマック™、アストミン™が処方された。ジスロマック™を服用したらひどい下痢になったので中止し、一般用医薬品のブスコパン™Aを服用しても良いか？（県民）

A：一般用医薬品のブスコパン™Aは今の下痢症状に効果はない。細菌感染の疑い等から抗生物質が処方されていると思われるので、医師に相談する。

【相互作用防止】

Q：便秘でダイオウなどを医師から処方されているが、下腹部の脂肪を取りたいので、一般用医薬品の防風通聖散を服用しても大丈夫か？（県民）

A：一般用医薬品の防風通聖散にもダイオウが含まれている。他の便秘薬を使用しているときは併用しない。

Q：ミキプルーンと芍薬甘草湯、人参養栄湯との相互作用は？（薬局）

A：商品ミキプルーンの原材料の1つにカンゾウエキスがある。これらの漢方薬には甘草が含まれており、併用により副作用が発現する可能性がある（むくみ、体重増加等）。

Q：アーチスト™、アスピリン、ワーファリン™、ヴォリブリス™を服用中の2歳児に、ホクナリン™テープが処方されたが、問題ないか？（薬局）

A：アーチスト™とホクナリン™は、 β 受容体において作用が拮抗する。また、心疾患のある患者では、心悸亢進や不整脈が現れる恐れがあり、注意が必要である。

【副作用防止】

Q：一般用医薬品のパンシロン™01 プラスを買った。「緑内障の方は薬剤師に相談」と書いてある。緑内障だが、飲んでも良いか？（県民）

A：パンシロン™01 プラスの成分のロートエキスは眼圧を高め症状を悪化させる場合があるので、眼科医に緑内障の状態を確認する。