

## 薬事情報センターに寄せられた県民・医療従事者からの相談事例 (2014年3月)

### 【適正使用】

Q：1年前に処方されたマーズレン™Sが残っている。いつまで使用できるか？飲んだら害が起るか？（県民）

A：基本的に処方された薬は、処方日数分が使用期限となる。通常、医薬品は流通期間を考慮して未開封で3年くらいの使用期限はあるが、処方された時点で、どのくらい経過していたか不明なので、安全性や有効性の保証はされない。

Q：歯痛。一般用医薬品のパファリン™Aを飲んだが、効かないのでリングル™アイビーを飲んで良いか？（県民）

A：いずれも鎮痛薬。パファリン™Aの服用後6時間以上あけてからリングル™アイビーを服用する。早めに歯科を受診する。

Q：ピソルボン™注とメロペネム注の配合変化は？（薬局）

A：ピソルボン™注のpHは2.2~3.2で4.71以上になると白濁する。メロペネム注のpHは6.7~8.7で、配合変化のデータはないが、白濁する可能性がある。

### 【受診勧告】

Q：下着による皮膚のかぶれで2年半前にリンデロン™VGとフェナゾール™を混ぜたものが処方された。塗ると良くなるが、中止するとまたかぶれる。2年半前の薬をずっと使用しているが、ステロイドなので副作用が心配。（県民）

A：間欠的・局所的使用なので、全身的な副作用の心配はないが、局所の副作用として、皮膚の萎縮や色素脱失、接触皮膚炎等がある。2年半前のもので汚染等の可能性もあり、使用は勧められない。症状を繰り返しているので、再度受診する。

Q：妊娠初期。お腹が張ってガスがたまっている感じがするので、一般用医薬品のガスピタン™を飲んで良いか？流産を繰り返し、アスピリンを服用中。（県民）

A：受診し、医師の診断により薬を処方してもらう。

### 【中毒】

Q：知人がボルタレン™錠を70錠くらい飲んだようだ。2時間くらい経っていると思うが、吐かせたら出てきた。まだ嘔気があるが、大丈夫か？（県民）

A：吐き出してはいるが、2時間である程度は吸収されている。今後、胃腸障害や腎障害等が起こる可能性もあり、処置が必要となる場合もあるのですぐに受診する。

#### 【妊婦・授乳婦】

Q：妊娠7週目。ファビ™点鼻液を継続して使っているが問題はないか？医師には妊娠を伝えていない。(県民)

A：妊娠初期に本剤（フルチカゾンプロピオン酸エステル）を点鼻したことにより、奇形の発生率の頻度や危険性が上昇するとは考えられない。今後、受診時や一般用医薬品を購入する時は、妊娠を処方医等に必ず伝える。

#### 【副作用防止】

Q：リウマトレックス™を木曜日に朝2C、夕1C服用中。最近息切れがして、歩くのも困難だったので、処方整形外科医に尋ねたら、急に中止はできないので朝1C、夕1Cに減量の指示があった。副作用ではないか？(県民)

A：副作用で間質性肺炎の初期症状の可能性がある。副作用であればX線撮影ですぐ判断できるので、呼吸器科の医師を受診し、これまでの経緯を説明する。