

## 薬事情報センターに寄せられた県民・医療従事者からの相談事例

(2015年7月)

### 【相互作用防止】

Q：エディロール™を服用中。医師からカルシウムが入った健康食品を止めるように言われたが、なぜか？（県民）

A：エディロール™は活性型ビタミンD<sub>3</sub>製剤で、小腸でのカルシウム吸収を助ける作用がある。カルシウムやビタミンDを含む市販の薬や健康食品を摂り過ぎると、高カルシウム血症（初期症状：からだのだるい、食欲が落ちる、いらいら感、ぼーっとする、注意力が散漫になる、吐き気、嘔吐、口の渇き、水を多く飲む、尿量が多くなる等）が起こる可能性があるため、使用は控える。

Q：オゼックス™を服用している。牛乳と一緒に飲んではいけないか？（県民）

A：牛乳と一緒に飲むと、薬の吸収が悪くなるので、2時間以上間隔を空ける。

### 【適正使用】

Q：7ヶ月児。アドソルビン™とミヤ™BMを服用中だが、咳がひどい。以前もらったアスペリン™とムコダイン™を飲ませて良いか？（県民）

A：以前もらった薬は、今の症状に適しているかどうか不明確なこと、自宅管理の面で品質に保証がもてないこと、自分勝手な使用では副作用がでた場合に被害救済制度を受けられないことから、使用しない。

Q：扁桃炎で、レボフロキサシン、ツムラ桔梗湯、サワシリン™、ロキソプロフェンナトリウムを服用中。頭痛がするので、イブクイック™を飲んで良いか？（県民）

A：イブクイック™（成分：イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン）とロキソプロフェンナトリウムは同効薬で、ロキソプロフェンナトリウムは頭痛にも効果があるので、併用しない。

### 【副作用防止】

Q：定期でパルミコート™とホクナリン™テープを、頓用でメプチン™吸入を使用中。咳が治まらないが、まだメプチン™吸入は使用していない。以前もらったホクナリン™ドライシロップは良く効いたので、ホクナリン™テープを剥がして残っているホクナリン™ドライシロップを使って良いか？（県民）

A：ホクナリン™テープは、24時間作用が持続する。ホクナリン™ドライシロップとホクナリン™テープは成分が同じである。剥がしても、ホクナリン™ドライシロップの服用で、過量投与になり、頻脈等の副作用がでる可能性がある。ホクナリン™テープを使って様子を見る。

Q：ワルファリン™からエリキュース™へはすぐに切り替えて良いか？（薬局）

A：ワルファリン™を中止後、PT-INRが2.0未満となってからエリキュース™を開始する。