

薬価基準追補収載(報告品目等)のお知らせ

令和3年11月24日

公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を令和3年11月24日に告示しました。適用は11月25日からです。

〔内 用 薬〕

劇:劇薬、処:処方箋医薬品、生:生物由来製品

| 分類 | 医薬品名(会社名) | 規格・単位 | 薬価(円) | 規制 | 備考(成分,薬効) |
|-----|--|---------------------------|----------------------------|-----|---|
| 449 | ピラノア OD錠 20mg (大鵬~Meiji Seika ファルマ) | 20mg1T | 66.80 | 処 | ピラスチン 適応は、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒。 新剤形(既発売品は、錠20mg)。 |
| 235 | モビコール配合内用剤 HD (EA ファーマ) | 13.7046g1包 | 139.80 | 処 | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム 適応は、慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)。 新規格(既発売品は、モビコール TM 配合内用剤で、モビコール TM 配合内用剤LDに名称変更)。 |
| 117 | レキサルティ OD錠 0.5mg // 1mg // 2mg (大塚) | 0.5mg1T 1mg1T 2mg1T | 136.80 260.60 496.50 | 劇 処 | プレクスピプラゾール 適応は、統合失調症。 新規格・新剤形(既発売品は、錠1mg・2mg)。 |

〔注 射 薬〕

| 分類 | 医薬品名(会社名) | 規格・単位 | 薬価(円) | 規制 | 備考(成分,薬効) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 399 | アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ0.2mL[MA] // 40mg シリンジ0.4mL[MA] // 80mg シリンジ0.8mL[MA] // 40mg ペン0.4mL[MA] (持田~あゆみ) | 20mg0.2mL1筒 40mg0.4mL1筒 80mg0.8mL1筒 40mg0.4mL 1キット | 20,604 39,913 77,392 40,056 | 劇 処 生 | アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3] ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体。 (適応) ・関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む) ・既存治療で効果不十分な下記疾患 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、強直性脊椎炎、腸管型ベーチェット病 ・中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ・中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>20mg シリンジ</th> <th>40mg シリンジ・ペン</th> <th>80mg シリンジ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関節リウマチ</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>尋常性乾癬、 関節症性乾癬、 膿疱性乾癬</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>強直性脊椎炎</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>腸管型ベーチェット病</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>クローン病</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> <tr> <td>潰瘍性大腸炎</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> </tr> </tbody> </table> | | 20mg シリンジ | 40mg シリンジ・ペン | 80mg シリンジ | 関節リウマチ | - | ○ | ○ | 尋常性乾癬、 関節症性乾癬、 膿疱性乾癬 | - | ○ | ○ | 強直性脊椎炎 | - | ○ | ○ | 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 | ○ | ○ | - | 腸管型ベーチェット病 | - | ○ | ○ | クローン病 | - | ○ | ○ | 潰瘍性大腸炎 | - | ○ | ○ |
| | 20mg シリンジ | 40mg シリンジ・ペン | 80mg シリンジ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関節リウマチ | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尋常性乾癬、 関節症性乾癬、 膿疱性乾癬 | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強直性脊椎炎 | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 | ○ | ○ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腸管型ベーチェット病 | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クローン病 | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潰瘍性大腸炎 | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | バイオ後続品。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|----------|--|
| 399 | スキリージ皮下注 150mg シリンジ 1mL // 150mg ペン 1mL (アッヴィ) | 150mg1mL1筒 150mg1mL 1キット | 474,616 474,761 | 劇 処 生 | リサンキズマブ(遺伝子組換え) ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体。 適応は、既存治療で効果不十分な、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症。 新規格(既発売品は、75mgシリンジ0.83mL)。 |
| 611 | ステルイズ水性懸濁筋注 60万単位シリンジ // 240万単位シリンジ (ファイザー) | 60万単位1筒 240万単位1筒 | 3,207 9,273 | 処 | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 持続性ペニシリン製剤。 <適応菌種>梅毒トレポネーマ <適応症>梅毒(神経梅毒を除く) 新投与経路(既発売品は、バイシリン™G顆粒40万単位で、適応症が異なる)。 |
| 429 | ヤーボイ点滴静注液 20mg (ブリストル・マイヤーズ スクイブ) | 20mg4mL1瓶 | 200,703 | 劇 処 生 | イピリムマブ(遺伝子組換え) 抗悪性腫瘍薬。 ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体。 適応は、根治切除不能な悪性黒色腫、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫。 新規格(既発売品は、50mg10mL)。 |
| 639 | ユルトミリス HI 点滴静注 300mg/3mL // 1100mg/11mL (アレクシオンファーマ) | 300mg3mL1瓶 1,100mg11mL1瓶 | 699,570 2,565,090 | 劇 処 生 | ラプリズマブ(遺伝子組換え) 抗補体(C5)モノクローナル抗体。 適応は、発作性夜間ヘモグロビン尿症、非典型溶血性尿毒症症候群。 新規格(既発売品は、ユルトミリス™点滴静注300mg。ユルトミリスHI点滴静注は、ユルトミリス™点滴静注の10倍の濃度)。 |
| 131 | ラニビズマブBS 硝子体内注射 用キット 10mg/mL「センジュ」 (千寿～武田) | 0.5mg0.05mL 1筒 | 85,535 | 劇 処 | ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続1] 眼科用VEGF阻害薬(ヒト化抗VEGFモノクローナル抗体Fab断片)。 適応は、中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、病的近視における脈絡膜新生血管。 バイオ後続品。 |