

薬価基準追補収載（報告品目等）のお知らせ

平成23年9月22日

社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を平成23年9月22日に告示、即日実施した。

〔内 用 薬〕

劇：劇薬、処：処方せん医薬品、生：生物由来製品

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	備考(成分, 薬効)
218	トライコア錠 53.3mg	53.3mg, 1 T	33.40	処	フェノフィブラート フィブラート系薬。 適応は高脂血症（家族性を含む）。 再審査終了後の新用法・用量に伴う剤形追加（既発売のカプセル67mg・100mgからの切替え製剤で、カプセルは発売中止予定）。 有効成分を微粉化せずに固体分散体化し、溶出性を向上させて吸収性を改善した製剤。カプセル 67mg および 100mg が錠剤 53.3mg および 80mg に相当。
	〃 80mg	80mg, 1 T	43.60		
	(アボット)				
	リピディル錠 53.3mg	53.3mg, 1 T	33.40		
〃 80mg	80mg, 1 T	43.60			
	(あすか〜武田〜科研)				

〔注 射 薬〕

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	備考(成分, 薬効)
245	エピペン注射液 0.15mg	0.15mg, 1 筒	8,112	劇 処	アドレナリン アナフィラキシー補助治療剤。副腎ホルモン剤。 適応は蜂毒、食物および薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療（アナフィラキシーの既往のある人またはアナフィラキシーを発現する危険性の高い人に限る）。 通常、0.01mg/kgが推奨用量で、患者の体重を考慮して、0.15mgまたは0.3mgを筋肉内注射（臀部からの注射を避け、大腿部の前外側から注射する。緊急時には衣服の上からでも注射可能）。 通常、成人は0.3mg製剤、小児は体重に応じて0.15mgまたは0.3mg製剤を使用。 0.01mg/kgを超える用量（体重30kg未満に0.3mg製剤、体重15kg未満に0.15mg製剤）を投与すると、過量となるおそれがあるので、副作用の発現等に十分な注意が必要で、0.01mg/kgを超える用量を投与する必要性については、救命を最優先し、患者ごとの症状を観察した上で慎重に判断する。 本剤には投与量安定化のために、2mLの薬液が封入されているが、投与量は約0.3mLで、注射後には約1.7mLの薬液が残るので、残液量をみて投与しなかったと誤解するおそれがあるので注意する。また、一度注射すると、再度注射しても薬液が放出しない仕組みとなっており、同一製剤を用いて2度注射しない。 本剤には安全キャップが装着されており、注射をする時まで絶対に安全キャップを外さない。 指または手等に誤注射した場合は、直ちに医療機関を受診するように指導する。 光で分解しやすいため携帯用ケースに保管し、15℃～30℃で保存する。 交感神経のα、β受容体に作用し、強心作用、血圧上昇作用、気管支拡張作用等により、ショック
	〃 0.3mg	0.3mg, 1 筒	10,950		
	(マイラン)				

					<p>時の循環状態を改善する。</p> <p>必ずインフォームドコンセントを実施し、患者に自らが適切に自己注射できるように指導し、患者、保護者またはそれに代わり得る適切な者が理解したことを確認した上で交付する。</p> <p>アナフィラキシー発現時の緊急補助的治療として使用するものであり、患者には、医療機関での治療に代わるものではなく、使用後は必ず受診するように指導する。</p> <p>注射針一体型の注射器にアドレナリンがあらかじめ充填されたキット製剤。</p> <p>[参考]</p> <p>0.3mg 製剤は林業家等の蜂毒によるアナフィラキシー反応に対する補助治療剤として 2003 年 8 月 1 日付で輸入承認を取得した。その後、蜂毒に限らず食物および薬物等に起因するアナフィラキシーへの使用が検討され、2005 年 3 月 4 日付で 0.3mg 製剤は新規効能追加の承認を、15mg 製剤は輸入承認を取得した。すでに自由診療で患者の自己注射として処方されていたが、今回、患者の自己負担を軽減するために保険適用されることとなった。</p>
613	フィニボックス 点滴静注用 0.5g (塩野義)	500mg, 1 瓶	1, 617	処	ドリペネム水和物 カルバペネム系抗生物質。 適応菌種は、ドリペネムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属 (エンテロコッカス・フェシウムを除く)、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌等。 適応は、敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷および手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎 (扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染等。 規格追加 (既発売は 250mg)。
241	フォリスチム注 900 IU カートリッジ (MSD)	900IU, 1 筒	49, 971	処 生	フォリトロピンベータ (遺伝子組み換え) ヒト卵胞刺激ホルモン。 適応は、複数卵胞発育のための調節卵巣刺激 (保険適用外)、視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵および希発排卵における排卵誘発 (保険適用)。 規格追加 (既発売は 300IU, 600IU)。
429	ベクティビックス 点滴静注 400mg (武田)	400mg, 20mL 1 瓶	287, 773	劇 処 生	パニツムマブ (遺伝子組み換え) 抗悪性腫瘍剤。ヒト型抗 EGF R (上皮細胞増殖因子受容体) モノクローナル抗体。 適応は、KRAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌。 規格追加 (既発売は 100mg)。
259	マグセント注シリンジ 40mL (東亜)	40mL, 1 筒	1, 596	処	硫酸マグネシウム・ブドウ糖 子宮収縮抑制剤。 適応は、切迫早産における子宮収縮の抑制。 プレフィルドシリンジのキット製品 (既発売は 100mL 瓶入り製剤)。