

## 薬事情報センターに寄せられた県民・医療従事者からの相談事例 (2015年11月)

### 【適正使用】

Q：膝の痛みに、整形外科処方のロキソニン<sup>TM</sup>、別の整形外科処方の防己黄耆湯、心療内科処方の疎経活血湯、内科処方の補中益気湯を服用中。相互作用は問題ないか？（県民）

A：それぞれの漢方薬に生薬成分の甘草が含まれており、とりすぎると、むくみ、高血圧、しびれなどの偽アルドステロン症が起こる可能性がある。

Q：脳外科処方のチクロピジン、アムロジピンを2ヶ月間服用。手や足にしびれ、視力の低下などが起こる。薬の副作用だと考え、服用を止めて良いか？（県民）

A：疾患による症状の可能性もある。自分勝手に服用を中止せず、医師に症状を伝える。

### 【相互作用】

Q：一般用医薬品の新セキリック<sup>TM</sup>液（カンゾウエキス、セネガエキス、マレイン酸クロルフェニラミン、リン酸ジヒドロコデイン、d l-塩酸メチルエフェドリン、無水カフェイン）を服用中。パファリン<sup>TM</sup>プレミアム（イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル）と一緒に飲んで良いか？（県民）

A：新セキリック<sup>TM</sup>液を服用中は、他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等）を服用しないこととなっており、パファリン<sup>TM</sup>プレミアムは服用しない。どちらにも無水カフェインが含まれており、不眠や神経過敏が起こる可能性がある。また、逆に、成分の副作用の眠気などが強く現れる可能性がある。

### 【重複投与防止】

Q：A病院処方のプラバスタチンNa、レザルタス<sup>TM</sup>HD、デパス<sup>TM</sup>、ロキソマリン<sup>TM</sup>、テグレートール<sup>TM</sup>を服用中。B病院からロキソニン<sup>TM</sup>、テルネリン<sup>TM</sup>、ムコスタ<sup>TM</sup>が処方されたが、一緒に飲んで良いか？（県民）

A：ロキソマリン<sup>TM</sup>とロキソニン<sup>TM</sup>は同じ成分で重複するので、一緒に服用しない。

Q：一般用医薬品のストナジェルサイナス<sup>TM</sup>S（アセトアミノフェン、ベラドンナ総アルカロイド、塩酸ジフェニルピラリン、d l-塩酸メリルエフェドリン、リン酸ジヒドロコデイン、塩酸ノスカピン、グアイフェネシン、無水カフェイン）とロキソニン<sup>TM</sup>、フロモックス<sup>TM</sup>との相互作用は？（歯科医師）

A：ストナジェルサイナス<sup>TM</sup>Sは、アセトアミノフェンを含有し、ロキソニン<sup>TM</sup>と作用が重複する。