

薬価基準追補収載（報告品目等）のお知らせ

平成29年11月28日
公益社団法人 福岡県薬剤師会薬事情報センター

厚労省は報告品目等の薬価基準追補収載を平成29年11月28日に告示した。11月29日から適用する。

〔内用薬〕

劇：劇薬，処：処方箋医薬品，生：生物由来製品

分類	医薬品名（会社名）	規格・単位	薬価（円）	規制	備考（成分，薬効）
399	エルカルチンFF内用液 10%分包 5mL	10%，5mL， 1包	362.00	処	レボカルニチン 適応は、カルニチン欠乏症。 既発売品は錠100m・250mg、内用液10%。
	〃 10%分包 10mL (大塚)	10%，10mL， 1包	724.00		
392	ジャドニユ顆粒分包 90mg 〃 顆粒分包 360mg (ノバルティス ファーマ)	90mg，1包 360mg，1包	1,433.80 5,707.70	劇 処	デフェラシロクス 適応は、輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合）。 新剤形（既発売品はエクジェイド TM 懸濁用錠125mg・500mg）で、本剤は水に懸濁することなくそのまま服用が可能。本剤のバイオアベイラビリティは食事の影響を受けないため食事の摂取にかかわらず投与可能。 本剤と懸濁用錠の有効性・安全性は同等。
429	タシグナカプセル 50mg (ノバルティス ファーマ)	50mg，1C (ニロチニブとして)	1,289.20	劇 処	ニロチニブ塩酸塩水和物 チロシンキナーゼ阻害薬。 適応は、慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病。 新規格（既発売品は150mg、200mg）。
333	リクシアナOD錠 15mg	15mg，1T	294.20	処	エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害薬。 適応は、非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制等。 新剤形（既発売品は錠剤15mg・30mg・60mg）。
	〃 OD錠 30mg	30mg，1T	538.40		
	〃 OD錠 60mg (第一三共)	60mg，1T	545.60		

〔外用薬〕

分類	医薬品名（会社名）	規格・単位	薬価（円）	規制	備考（成分，薬効）
121	エムラパッチ (佐藤製薬～ アストラゼネカ)	1枚	251.60	劇 処	リドカイン・プロピトカイン 局所麻酔剤。 1枚中の含量：リドカイン25mg プロピトカイン25mg 適応は、皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和、注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和。 成人は、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に60分間貼付。なお、1回あたりの貼付枚数は10枚までとし、貼付時間は120分を超えない。 小児等には、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に60分間貼付する。なお、1回あたりの貼付枚数は10枚までとし、貼付枚数及び貼付時間は規定の量を超えない。 新剤形（既発売品はエムラ TM クリーム）。

[注射薬]

分類	医薬品名(会社名)	規格・単位	薬価(円)	規制	備考(成分, 薬効)
634	アコアラン静注用 1800 (協和発酵キリン～ 日本血液製剤機構)	1,800IU, 1瓶 (溶解液付)	84,861	生 処	アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え) 適応は、先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群 (DIC)。 新規格 (既発売品は600国際単位)。
239	インフリキシマブ BS 点滴 静注用 100mg 「CTH」 (セルトリオン・ヘルスケ ア・ジャパン)	100mg, 1瓶	56,382	劇 処 生	インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続1] 抗ヒトTNF α モノクローナル抗体。 適応は、既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む) 等。 バイオ後続品。
239	インフリキシマブ BS 点滴 静注用 100mg 「あゆみ」 (ヤクハン製薬～ あゆみ製薬) インフリキシマブ BS 点滴 静注用 100mg 「日医工」 (日医工)	100mg, 1瓶 100mg, 1瓶	56,382 56,382	劇 処 生	インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続2] 抗ヒトTNF α モノクローナル抗体。 適応は、既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む) 等。 バイオ後続品。
399	エルカルチン F F 静注 1000mg シリンジ (大塚)	1,000mg, 5mL 1筒	1,035	処	レボカルニチン 適応はカルニチン欠乏症。 キット製品。 新剤形 (既発売品はアンプル)。
429	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg 「KHK」 〃 点滴静注 500mg 「KHK」 (サンド～ 協和発酵キリン)	100mg, 10mL 1瓶 500mg, 50mL 1瓶	24,930 122,143	処 生	リツキシマブ (遺伝子組換え) [リツキシマブ後続1] 抗CD20モノクローナル抗体。 適応は、CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫等。 バイオ後続品。
218	レパーサ皮下注 420mg オートミニドージャー (アステラス・アマジェ ン・バイオフーマ～ アステラス)	420mg, 3.5mL 1キット	44,481	処 生	エボロクマブ (遺伝子組換え) ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体。 適応は、家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症。ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る。 キット製品。 薬剤を充填したカートリッジと専用自動注入器であるオートミニドージャーから構成。 新剤形 (既発売品は皮下注140mgシリンジ・皮下注140mgペン)。